

ESTUDO ESPECTROSCÓPICO EM ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE FLAVONOIDES DE *Solanum jabrense* AGRA & NEE E *S. paludosum* MORIC.

Tania Maria Sarmiento da Silva*

Departamento de Química, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, 52171-900 Recife - PE, Brasil

Mario Geraldo de Carvalho

Departamento de Química, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR 465, km 07, 23890-000 Seropédica - RJ, Brasil

Raimundo Braz-Filho

Setor de Química de Produtos Naturais, CCT, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Av. Alberto Lamego, 2000, 28013-600 Campos dos Goytacazes - RJ, Brasil

Recebido em 6/3/08; aceito em 8/1/09; publicado na web em 28/5/09

SPECTROSCOPY STUDY ON STRUCTURAL ELUCIDATION OF FLAVONOIDS FROM *Solanum jabrense* Agra & Nee e *S. paludosum* Moric. The NMR (RMN¹H, ¹³C, COSY, HMQC, HMBC, NOE-DIFF, NOESY) and mass spectra data analysis of sixteen flavonoids, including nine natural, 7-*O*-methylkanferol (ramnocitrin), 3,7-di-*O*-methylkanferol (kumatakenin), 3-*O*-methylquercetin, 3,7,3',4'-tetra-*O*-methylquercetin (retusin), 3,7,8,4'-tetra-*O*-methylgossipetin, 3,7,8,3',4'-penta-*O*-methylgossipetin, 7-*O*-metilapigenin (genkwanin), 3,7,8-tri-*O*-metilherbacetin, 7,4'- di-*O*-methylquercetin (ombuine), isolated from *Solanum paludosum* and *S. jabrense*, and seven prepared methyl and acetyl derivatives, are discussed according the substitution on the rings A, B and C.

Keywords: *Solanum paludosum*; *Solanum jabrense*; flavonoids.

INTRODUÇÃO

O estudo químico envolvendo as partes aéreas de *Solanum paludosum* Moric. e *S. jabrense* Agra & Nee resultou no isolamento de 8 e 7 flavonoides, respectivamente. Em trabalhos anteriores relatou-se a presença dos flavonoides 7-*O*-metilkanferol (ramnocitrina, **1**), 3,7-di-*O*-metilkanferol (kumatakenina, **2**), 3-*O*-metilquercetina (**7**), 3,7,3',4'-tetra-*O*-metilquercetina (retusin, **8**), 3,7,8,4'-tetra-*O*-metilgossipetina (**11**), 3,7,8,3',4'-penta-*O*-metilgossipetina (**12**), 7-*O*-metilapigenina (genkwanina, **15**), 3,7,8-tri-*O*-metilherbacetina (**16**) em *S. paludosum*^{1,2} e **1**, **2**, **7**, **7,4'**- di-*O*-metilquercetina (ombuina, **6**), **8**, **11** e **12** em *S. jabrense*.³ Destes 3,7,8,4'-tetra-*O*-metilgossipetina, 3,7,8,3',4'-penta-*O*-metilgossipetina, 7-*O*-metilapigenina, 7-*O*-metilkanferol e 7,4'- di-*O*-metilquercetina foram isolados pela primeira vez no gênero *Solanum*, apresentando, portanto, uma grande contribuição para o entendimento da quimiotaxonomia do gênero.

Muitos flavonoides ocorrem amplamente na natureza e é muito difícil obter em quantidade suficiente de fonte natural para identificação das estruturas. Os dados de RMN de muitos flavonoides hidroxilados, metoxilados e acetilados podem ajudar a identificar novos flavonoides isolados de fontes naturais baseados nos experimentos de RMN.

Uma vez que os flavonoides das espécies *S. paludosum* e *S. jabrense* foram isolados em quantidade razoável, este trabalho mostra a preparação dos derivados metilados **3** (7,4'-di-*O*-metilkanferol) e **9** (3, 5, 7, 3',4'-penta-*O*-metilquercetina), e acetilados **4** (3,7-di-*O*-metil, 5,4'-di-*O*-acetilkanferol), **5** (5 7-di- *O*-metil, 3,5,4'-tri-*O*-acetilkanferol), **10** (3,7,3',4'-tetra-*O*-metil, 5-*O*-acetilquercetina), **13** (3,7,8,3',4'-penta-*O*-metil, 5-*O*-acetilgossipetina) e **14** (3,7,8,4'-tetra-*O*-metil, 5,3'-di-*O*-metilgossipetina). Considerando que estes dados podem variar consideravelmente pela introdução de grupos hidroxila, metoxila e acetila nas estruturas dos flavonoides, faz-se uma discus-

são dos dados espectroscópicos de RMN e massas obtidos de todos os flavonoides naturais e dos derivados preparados por reações de metilação e acetilação.

PARTE EXPERIMENTAL

Procedimentos experimentais gerais

Os espectros de RMN ¹H e ¹³C (1D e 2D) foram registrados em espectrômetros Bruker DRX-500 (¹H: 500 MHz; ¹³C: 125 MHz), Bruker AMX-300 (¹H: 300 MHz; ¹³C: 75 MHz), Bruker AC-200 (¹H: 200 MHz; ¹³C: 50 MHz) e JEOL Eclipse-400 (¹H: 400 MHz; ¹³C: 100 MHz) em tubos de 5 mm, utilizando DMSO-d₆, CDCl₃ ou acetona-d₆ como solvente e TMS como referência interna. Utilizaram-se os programas de pulsos da Bruker [zg30 (¹H), zgpg30 (¹³C BBHD), dept135 (¹³C DEPT), cosygs (¹H-¹H COSY), inv4gstp (HMQC), inv4gslld (HMBC) e noesygpph (¹H-¹H NOESY)] com probe dual ¹³C/¹H para detecção normal (¹³C) ou com detecção inversa para (¹H) com z-gradient; obtiveram-se espectros com 32 e 64 K e largura de 12 e 31 kHz para ¹H e ¹³C em uma dimensão, respectivamente. Espectros 2D de correlação heteronuclear com detecção inversa foram coletados com 1 K, largura de 5 kHz em F₂, e 27 kHz x 256 em F₁. Os processamentos dos dados foram feitos com 1 K x 256 w, usando retorno linear em F₁ para gerar a matriz. Os valores de *J* usados na implementação das sequências do HSQC e HMBC foram: 145 Hz (¹J_{CH}) e 9,0 Hz (ⁿJ_{CH}, n > 1), respectivamente.

Os experimentos de NOESY foram obtidos com 5 kHz para F₁ e F₂ e blocos de 1 K x 1 K, *mixing time* 1 s, processados com ajustamento de fase, seguido de simetriação dos dados da matriz.

Processamentos semelhantes foram usados nos experimentos com o aparelho da Jeol, com parâmetros típicos para ¹H com pulso de 45° (espectros com 16 K e com 15 ppm). Os experimentos 2D (HMQC e HMBC) foram modulados com os mesmos valores de ¹J_{CH} e ⁿJ_{CN}

*e-mail: sarmiento@pesquisador.cnpq.br

descrito acima. Os experimentos para detectar NOE realizados no espectrômetro AC-200 foram obtidos com o programa NOEDIFF.AU da Bruker com irradiação na frequência das metoxilas.

Os espectros de massas de baixa resolução foram registrados em sistema acoplado CG/EM: Varian Saturn 2000 (3900GC e CP-1177); CG/EM HP-5989A; GC HP-5880A e HP-5897A com analisador de íons através de quadrupolo e ionização por impacto de elétrons, 70 eV.

Usaram-se placas de sílica gel 60 PF₂₅₄ Merck para cromatografia em camada delgada analítica e como reveladores utilizados luz ultravioleta (254 e 366 nm), soluções de AlCl₃-EtOH (1%) e ácido difenilbórico etanolamina-MeOH (NP, 1%).

Material vegetal e isolamento dos flavonoides

As partes aéreas de *Solanum paludosum* foram coletadas em janeiro de 1999 no campus universitário de João Pessoa, Paraíba e colocada em estufa a 40 °C por uma semana.

O material seco e pulverizado (1,1 kg) foi percolado com etanol. A solução extrativa foi concentrada em rotavapor à 40 °C sob pressão reduzida, resultando em um extrato de cor verde escura (100,1 g). Este extrato foi dissolvido em ácido acético 20% e adicionado benzeno:éter, obtendo-se duas soluções extrativas, uma benzeno:éter etílico e outra ácida.

A solução extrativa benzeno:éter foi evaporada em rotavapor, fornecendo o extrato benzeno etéreo (50,0 g) que foi suspenso em metanol:água (8:2) e particionado com hexano e AcOEt. Os solventes hexano e AcOEt foram evaporados, fornecendo os extratos hexânicos (31,5 g) e acetato de etila (12,0 g).

O extrato hexânico foi solubilizado com CH₂Cl₂ e precipitado com MeOH a frio. O resíduo da água mãe foi submetido à cromatografia em coluna com sílica gel usando como eluentes hexano, AcOEt e MeOH em ordem crescente de polaridade, fornecendo doze frações. A quinta fração após recristalização rendeu 200,0 mg da substância **8**, cristais amarelos em forma de agulhas. Este flavonoide foi metilado (20,0 mg) e acetilado originou **9** (18,0 mg; 90%) e **10** (22,9 mg, rendimento quantitativo), respectivamente. A sexta fração foi submetida à cromatografia em coluna com sílica gel, tendo como eluentes hexano, acetato de etila e metanol, em grau crescente de polaridade, fornecendo quatro frações da qual a terceira fração cristalizou em forma de agulhas amarelas, substância **12** (25,0 mg) que foi acetilada (15,0 mg) fornecendo o flavonoide **13** (10,0 mg; 52,4%).

O resíduo obtido da solução AcOEt (12,0 g) foi cromatografado em Sephadex LH-20 (Coluna A), fornecendo quatro frações. A segunda fração (A-2) foi submetida à coluna rápida de sílica gel sob média pressão, coletando-se dez frações. As frações A-2/2 e A-2/3 forneceram um material cristalino amarelo, em forma de agulhas, que foram separados da água mãe e identificados como os flavonoides **11** (120,0 mg) e **1** (40,0 mg), respectivamente. O flavonoide **1** foi metilado (4,0 mg) e acetilado (10,0 mg) fornecendo a substância metilada **3** (4,0 mg; 95,7%) e o flavonoide peracetilado **5** (10,0 mg; 70,4%), respectivamente. O constituinte **11** (43,6 mg) também foi acetilado com anidrido acético na presença de piridina, fornecendo o produto **14** (40,0; 58%). A água mãe da fração A-2/3 foi submetida a várias filtrações em colunas de Sephadex LH-20 e sílica gel sob média pressão, obtendo-se uma mistura contendo os flavonoides **1** e **15** (40,0 mg), o flavonoide **2** puro (50,0 mg) e a mistura de **2** e **16** (19,8 mg). A terceira fração da coluna A (A-3) foi cromatografada em Sephadex LH-20, obtendo-se uma mistura das substâncias **7** e o ácido protocatecuico. O flavonoide **2** (18,0 mg) foi acetilado e forneceu **4** (14,0 mg; 61%).

As partes aéreas de *Solanum jabrense* foram coletadas na Paraíba, Nordeste do Brasil em setembro de 2000.

O pó seco e moído de *S. jabrense* (34 g) foi extraído com EtOH em temperatura ambiente até completa exaustão. A solução extrativa foi concentrada sob pressão reduzida fornecendo 5,3 g de *S. jabrense*. Uma parte do resíduo do extrato de *S. jabrense* foi suspenso em H₂O:AcOH (8:2) e extraído com hexano:éter (1:1). O solvente foi evaporado e o extrato hexano etéreo foi dissolvido em MeOH:H₂O (4:1) e extraído com hexano e AcOEt. O extrato acetato de etila (1,2 g) foi cromatografado com Sephadex LH-20 em CHCl₃:MeOH (1:1) para remoção da clorofila dos flavonoides totais. As frações flavonoidicas obtidas foram analisadas em placas cromatográficas de camada fina com sílica gel 60 F254 e a visualização foi feita com a solução de difenilboriloxietilamina (NP, 1%) em MeOH e AlCl₃-EtOH (1%), sendo observado na luz ultravioleta em 366 nm. A fração foi filtrada com CHCl₃ e MeOH em cartuchos de sílica C-18 (Sep-Pak C-18). A fração clorofórmica foi evaporada, redissolvida em MeOH e filtrada sobre a membrana de 0,45 µm (Millipore) para análise em CLAE.

A identificação das substâncias no extrato foi feita por comparação dos tempos de retenção entre os picos desconhecidos e os flavonoides padrões e por cocromatografia dos extratos com os flavonoides padrões. O cromatograma do extrato mostrou a presença de todos os flavonoides isolados de *S. paludosum*. Após a análise o extrato foi cromatografado com Sephadex LH-20 e foram isolados os flavonoides **1**, **6** e **8**.

Parte dos dados sobre o isolamento encontra-se registrados em publicações anteriores.¹⁻³

Preparação de derivados

Metilação com diazometano

Uma solução de diazometano (CH₂N₂) foi preparada em éter e adicionada (em excesso) em gotas às soluções das substâncias em CHCl₃ ou MeOH. Após a eliminação do solvente obtiveram-se as substâncias metiladas.

Permetilação com sulfato de dimetila

Sulfato de dimetila (Me₂SO₄) foi usado para a permetilação dos flavonoides. À solução dos flavonoides em acetona seca adicionou-se 1,1 eq. de K₂CO₃, e 1,1 eq. de sulfato de dimetila para cada hidroxila livre. A mistura resultante, na temperatura ambiente, foi agitada durante 2 h e monitorada através de análise por placa cromatográfica. Após a conclusão da reação, o solvente foi destilado em rotavapor sob pressão reduzida e o material oleoso obtido foi suspenso em água (cerca de 50 mL), tratado com 5 mL de solução de hidróxido de amônio concentrado e extraído com CH₂Cl₂ (com 3 vezes 15 mL). A solução das frações orgânicas reunidas foi seca com sulfato de sódio anidro e o solvente removido em rotavapor mantido sob pressão reduzida. Em alguns casos obteve-se recristalização em acetona ou MeOH.⁴

As substâncias foram submetidas a tratamento com anidrido acético e piridina (1:1) e a mistura mantida em repouso durante 48 h. Após esse período, foi tratada com água destilada gelada, obtendo-se o material precipitado. O precipitado foi filtrado e lavado várias vezes com água destilada, dissolvido em diclorometano e seco com sulfato de sódio anidro. Após evaporação do solvente em rotavapor obtiveram-se as substâncias acetiladas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os flavonoides (**1**, **2**, **7**, **8**, **11**, **12**, **15** e **16**) foram isolados das partes aéreas de *S. paludosum* através de cromatografia utilizando Sephadex LH-20.^{1,2} A metilação do flavonoide **1** com diazometano forneceu **3**, contendo grupo metoxila adicional na posição 4', enquan-

to que a acetilação de **2** produziu **4**, derivado acetilado com funções acetoxílicas nas posições 3 e 4' e de **1** forneceu **5**, sustentando grupos acetoxílicos nas posições 3, 5 e 4'. O flavonoide **8** foi metilado com sulfato de dimetila e acetilado com anidrido acético na presença de piridina para fornecer os derivados permetilado **9** e o derivado monoacetílico **10** (acetila na posição 5), respectivamente. Os flavonoides **11** e **12** foram acetilados com anidrido acético na presença de piridina e forneceram os produtos acetilados **14** e **13**, respectivamente.

Das partes aéreas de *S. jabrense* foram isolados os flavonoides **1**, **6** e **8**, sendo os demais (**2**, **7**, **11** e **12**) identificados nos tricomas das partes aéreas através de análise por cromatografia de alta eficiência (CLAE).³

Os padrões de substituição dos anéis aromáticos (anéis **A** e **B**) e heterocíclico (anel **C**) dos flavonoides isolados foram usados para definir os grupos responsáveis pelos diferentes perfis observados nos espectros de RMN¹H e ¹³C. A Figura 1 revela as estruturas dos flavonoides naturais e dos derivados obtidos por metilação e/ou acetilação.




Figura 1. Estrutura dos flavonoides naturais e dos derivados obtidos por metilação e acetilação

Espectro de RMN ¹H dos flavonoides

Caracterização do anel A

O padrão de oxigenação dos flavonoides naturais (**1**, **2**, **6-8**, **11**, **12**, **15** e **16**) e dos derivados (**3-5**, **9-10**, **13** e **14**) foi determinado pelo espectro de RMN ¹H (Tabela 1). Os espectros dos flavonóis **11-14** e **16** apresentaram apenas um sinal simples com deslocamento químico entre δ_{H} 6,41 e 6,66 para um hidrogênio aromático localizado no anel A, indicando a presença de três substituintes oxigenados. A presença de um simpleto em região mais desblindada dos flavonóis naturais **11** e **12** (δ_{H} 12,47) e **16** (δ_{H} 12,55) indicou a presença de uma hidroxila quelatogênica em C-5. A acetilação da hidroxila quelada HO-5 em **13** e **14** gerou, como previsto, a desblindagem ($\Delta\delta = 0,25$ ppm) no hidrogênio H-6 presente no anel A em posição *orto*,⁵ como consequência da atenuação do efeito mesomérico promovido pela deslocalização dos elétrons não compartilhados do átomo de oxigênio devido à presença da carbonila do grupo acetoxila.

Os espectros dos flavonóis **1-10** e da flavona **15** revelaram a presença de dois sinais para átomos de hidrogênio localizados no anel A (Tabela 1), com a constante acoplamento (*J*) indicando interação spin-spin de hidrogênios mantendo entre si relação *meta* (*J*=1,9-2,2 Hz) e correspondendo aos hidrogênios H-6 (δ_{H} 6,25 – 6,66) e H-8 (δ_{H} 6,46 – 6,84).

Caracterização do anel B

O anel B dos flavonóis **1-5**, **15** e **16** revelou a presença de sinais característicos de um sistema aromático *para* dissubstituído, sendo, consequentemente, representado por dois dupletos correspondentes aos dois pares de átomos de hidrogênio (H-2'/H-6': δ_{H} 7,85 – 8,11; e H-3'/H-5': δ_{H} 6,67 – 7,25) acoplados através de interação spin-spin em *orto* (*J*=6,0-8,8 Hz), constituindo um típico sistema AA'BB' (Tabela 1).

O anel B dos flavonóis **6-14** apareceu representado por três sinais (Tabela 1) correspondentes aos três hidrogênios localizados em ambientes químicos diferentes (H-2': δ_{H} 7,67 – 7,91; H-5': δ_{H} 6,98 – 7,10; H-6': δ_{H} 6,69 – 8,08). Os valores dos deslocamentos químicos e das constantes de acoplamento (*meta*: *J*=1,3-2,4 Hz; *orto*: *J*=8,4-8,8 Hz) destes átomos de hidrogênio (Tabela 1) permitiram definir o padrão de substituição do anel B. Um dos sinais apareceu como um duplo duplete (em alguns como um simpleto largo) acoplado com os dois hidrogênios restantes que não acoplam entre si. Os valores das constantes de acoplamento (*J*=1,3-2,4 e 8,4-8,8 Hz) são característicos de interações *meta* e *orto* também em flavonoides oxigenados. Os valores dos deslocamentos químicos e das constantes de acoplamento observadas nos espectros de RMN¹H dos flavonóis **6-14** permitiram propor a localização das funções oxigenadas nas posições 3' e 4' (Tabela 1).

Caracterização do anel C

Apenas o flavonoide **15** apresentou um sinal simpleto em δ_{H} 6,82, sugerindo a presença de um hidrogênio metínico, H-3, característico de flavona.⁶

Além do padrão de substituição dos anéis presentes no esqueleto de flavonoides, os espectros de RMN ¹H permitiram deduzir a natureza e o número de grupos substituintes (sinais simples de grupos metoxílicos δ_{H} 3,84 – 3,96; grupos hidroxílicos localizados em C-5, envolvido em ligação de hidrogênio δ_{H} 12,13 – 12,94 e, as hidroxilas localizadas em outras posições revelaram-se mais sensíveis aos efeitos de solvente, H₂O presente no solvente e temperatura. Os espectros de RMN¹H dos derivados acetilados, **4**, **5**, **10**, **13** e **14** mostraram também a presença de sinais simples entre δ_{H} 2,3-2,5 referentes aos grupos metílicos das acetoxilas (Tabela 1).

Análise dos dados de massas

Os espectros de massas dos flavonoides naturais mostraram picos intensos correspondentes aos íons moleculares: **1** (*m/z* 300, [M⁺]), **2** (*m/z* 314, [M⁺]), **7** (*m/z* 316, [M⁺]), **8** (*m/z* 358, [M⁺]), **11** (*m/z* 374, [M⁺]), **12** (*m/z* 388, [M⁺]) e **16** (*m/z*, 344 [M⁺]). Com base no pico correspondente ao íon molecular pôde-se deduzir o número de hidroxilas e metoxilas presentes como substituintes. O flavonoide acetilado, **4** não revelou o pico correspondente ao íon molecular (*m/z* 356) e mostrou o pico em M⁺-42 ([M-CH₂=C=O]⁺) devido à fragmentação do grupo acetoxila com eliminação de ceteno (O=C=CH₂). Os derivados acetilados **5** (*m/z* 426, [M⁺]) **13** (*m/z* 388, [M⁺]) e **14** (*m/z* 416, [M⁺]) revelaram os picos referentes aos íons moleculares. Os espectros de massas dos flavonoides naturais **11** (*m/z* 359), **12** (*m/z* 373) e **16** (*m/z* 329) sustentando uma metoxila em C-8 revelaram pico base em [M-15]⁺ e o derivado acetilado **13** (*m/z* 359) em ([M-42-15]⁺), em acordo com Goudard *et al.*,⁷ que sugeriu a relação entre as intensidades [M]⁺/[M-15]⁺ como um método para distinguir

Tabela 1. Deslocamentos químicos dos átomos de hidrogênio dos flavonoides naturais e derivados, em ppm (δ_H)*

Flavonoide	OH														AcO
	H-3	H-6	H-8	H-2'	H-3'	H-5'	H-6'	3	5	7	8	2'	3'	4'	
(1) 3,5,4'(OH)/7(OMe) ^a	-	6,32(sl)	6,71(sl)	8,06(d)	6,92(d)	6,92(d)	8,06(d)	10,14(s)	12,46(s)	3,84(s)	-	-	-	-	
(2) 5,4'(OH)/3,7(OMe) ^a	-	6,35(sl)	6,74(sl)	7,96(d)	8,67(d)	8,67(d)	7,96(d)	3,78(s)	12,65(s)	3,84(s)	-	-	-	-	
(3) 3,5(OH)/7,4'(OMe) ^a	-	6,36(d)	6,75(d)	8,09(d)	6,94(d)	6,94(d)	8,09(d)	10,14(s)	12,48(s)	3,87(s)	-	-	-	3,87(s)	
(4) 5,4'(OAc)/3,7(OMe) ^b	-	6,62(d)	6,83(d)	8,11(d)	7,25(d)	7,25(d)	8,11(d)	3,81(s)	2,35(s)	3,92(s)	-	-	-	2,48(s)	
(5) 3,5,7(OAc)/7(OMe) ^b	-	6,65(d)	6,84(d)	7,85(d)	7,25(d)	7,25(d)	7,85(d)	2,33(s)	2,44(s)	3,91(s)	-	-	-	2,35(s)	
(6) 3,5,3'(OH)/7,4'(OMe) ^c	-	6,31(d)	6,68(d)	-	-	-	7,81(dd)	-	12,13(s)	3,92(s)	-	-	-	3,93(s)	
(7) 5,7,3',4'(OH)/3(OMe) ^c	-	6,25(d)	6,48(d)	7,69(d)	-	-	7,57(dd)	3,86(s)	12,80(s)	-	-	-	-	-	
(8) 5(OH)/3,7,3',4'(OMe) ^b	-	6,37(d)	6,46(s)	7,70(d)	-	7,00(d)	7,74(dd)	3,87(s)	12,64(s)	3,89(s)	-	-	3,97(s)	3,98(s)	
(9) 3,5,7,3',4'(OMe) ^b	-	6,39(d)	6,57(d)	7,74(d)	-	7,02(d)	7,71(sl)	3,83(s)	3,96(s)	3,93(s)	-	-	3,98(s)	3,98(s)	
(10) 5(OAc)/3,7,3',4'(OMe) ^b	-	6,61(d)	6,82(d)	7,67(d)	-	6,99(d)	6,69(dd)	3,97(s)	2,47(s)	3,91(s)	-	-	3,96(s)	3,97(s)	
(11) 5,3'(OH)/3,7,8,4'(OMe) ^b	-	6,41(s)	-	7,78(sl)	-	6,98(d)	7,76(sl)	3,87(s)	12,47(s)	3,94(s)	3,91(s)	-	-	3,97(s)	
(12) 5(OH)/3,7,8,3',4'(OMe) ^b	-	6,43(s)	-	7,82(d)	-	7,03(d)	7,87(dd)	3,87	12,47(s)	3,93(s)	3,91(s)	-	3,96(s)	3,97(s)	
(13) 5(OAc)/3,7,8,3',4'(OMe) ^b	-	6,66(s)	-	7,78(d)	-	7,01(d)	7,84(dd)	3,81	2,47(s)	3,96(s)	3,96(s)	-	3,97(s)	3,98(s)	
(14) 5,3'(OAc)/3,7,8,4'(OMe) ^b	-	6,66(s)	-	7,91(d)	-	7,10(d)	8,08(dd)	3,81	2,46(s)	3,96(s)	3,89(s)	-	2,36(s)	3,96(s)	
(15) 5,4'(OH)/7(OMe) ^a	6,82(s)	6,32(sl)	6,71(sl)	7,94(sl)	6,92(d)	6,92(d)	7,94(sl)	-	12,94(s)	3,84(s)	-	-	-	-	
(16) 5,4'(OH)/3,7,8(OMe) ^a	-	6,58(d)	-	7,97(d)	6,98(d)	6,98(d)	7,97(d)	3,80(s)	12,55(s)	3,91(s)	3,81(s)	-	-	10,27(s)	

*Os espectros foram obtidos em ^aDMSO-d₆, ^bCDCl₃ e ^cAcetona-d₆ tendo como referência interna o TMS. As constantes de acoplamento para os sinais múltiplos foram de aproximadamente: J_{6,8}=2,0 Hz; J_{2,3}=8,5 Hz; J_{2,6}=2,0 Hz; J_{5,6}=8,5 Hz. Espectros 2D ¹H-¹H-COSY, ¹H-¹H-NOESY, HMQC e HMBC foram também usados na atribuição dos deslocamentos químicos. Os valores dos deslocamentos químicos e das constantes de acoplamento (J) dos átomos de hidrogênio foram obtidos dos espectros 1D de RMN¹H.

os flavonoides com os substituintes nas posições 5,6,7 ou 5,7 e 8. A abundância relativa dos picos M e M-15 no espectro de massas permite a diferenciação de 5-hidroxi-7,8-dimetoxi e 5,7,8-trimetoxiflavonas (M>M-15) de 5-hidroxi-7,8-dimetoxi e 5,6,7-trimetoxiflavonas (M<M-15), respectivamente.

A perda de um radical hidrogênio a partir do íon molecular, originando um pico com abundância relativa maior que 50%, foi observada nos espectros de massas dos flavonoides que não sustentam metoxila em C-8 **1 - 3**, **6 - 9** e **15** e nos derivados acetilados **4**, **5**, **10**, **13** e **14**. A preferência para a eliminação de H-2' e/ou H-6' pode ser justificada pela formação de íon com estabilidade justificada por efeito mesomérico (**I**), o mesmo não ocorrendo com **II** formado pela eliminação de radical do flavonoide **15**. Nos casos da presença de grupo metoxila em C-8 ocorre influência favorável à reação de eliminação de radical metila (**III**). O mesmo podendo ocorrer com flavonoides sustentando metoxila em C-6 (**IV**) (Figura 2).




Figura 2. Íons de flavonoides formados por: efeito mesomérico (I), eliminação de radical do flavonoide 15 (II), presença do grupo metoxila em C-8 (III) e em C-6 (IV)

Outros picos representantes de íons formados a partir do íon molecular podem ser justificados pela eliminação de unidade estrutural representada pela perda de 30 (H₂CO), 29 (HCO), 18 (H₂O), 43 (CH₃CO), que foram observados em vários espectros de massas como unidades de massa/carga.

A fragmentação mais característica de todos os flavonoides foi atribuída à clivagem no anel C pela reação retro Diels-Alder,⁸ fornecendo os fragmentos representados por V e VI com valores de *m/z* dependentes dos substituintes presentes em cada um dos anéis A e B (Figura 3). Sendo R=OMe (**VIb**), observado em flavonoides com metoxila em C-3, verifica-se condição estrutural para eliminar formaldeído (CH₂O = 30) e fornecer também o fragmento representado por **VIa** (Tabela 2).

Tais fragmentos podem ser acompanhados por **VII** (VI + H oriundo de rearranjo) e **VIII** formado através de processo de fragmentação que preserva a ligação do oxigênio 1 e o átomo de carbono C-2 (Tabela 2).

Nos casos de 1, 2, 4-14 e 16 aparecem os picos com valores típicos para os padrões de substituição (Ia-Ic; IIa-IId) nos anéis A e B (Figura 4 e Tabela 2).

Análise dos dados de RMN ¹³C

Embora as informações obtidas nos espectros de RMN¹H e de massas tenham permitido deduzir as propostas das estruturas, infor-




Figura 3. Fragmentação de retro Diels-Alder




Figura 4. Estruturas dos picos principais observados nos espectros de massas dos flavonoides 1, 2, 4-14 e 16

mações relevantes e mais conclusivas foram obtidas pelos espectros de RMN ¹³C. Os dados obtidos nos espectros de RMN ¹³C dos flavonoides naturais e dos derivados metilado e acetilado encontram-se na Tabela 2.

Sinais de carbonos metoxílicos

É relativamente bem conhecido⁷⁻¹⁰ que os sinais de carbonos metoxílicos localizados em sistemas aromáticos envolvidos em impedimento estérico aparecem em torno de δ_{CH_3} 60, revelando diferença significativa quando se compara com valores em torno de δ_{CH_3} 56 observados quando se encontram em posições livres de influência estérica (sem substituintes nas duas posições *orto*). A combinação das informações fornecidas pelos espectros de RMN ¹H sobre o padrão de substituição e os deslocamentos químicos dos carbonos de grupos metoxílicos revelados pelos espectros de RMN ¹³C permitiu eliminar muitos isômeros estruturais, simplificando os trabalhos de elucidação estrutural. No caso de **7** (3-*O*-metilquercetina), o simples sinal da única metoxila em δ_{CH_3} 58.84 revelou-se consistente somente com a metoxilação no C-3. De modo semelhante, o flavonol **11** mostrou a presença de dois sinais com deslocamentos químicos característicos de duas metoxilas impedidas, permitindo admitir a presença de MeO-3 e em mais uma posição com impedimento estérico. Nos casos em que aparecem sinais de metoxilas em $\approx \delta_{\text{CH}_3}$ 56.00 podem-se descartar as possibilidades de localização de grupo metoxila em C-3 ou em outra posição impedida, como foi observado para as substâncias naturais **1**, **3** e **15**, que permitiram definir a metoxilação somente nas posições, C-7 ou C-4' (Tabela 3).

Tabela 2. Picos principais observados nos espectros de massas dos flavonoides **1**, **2**, **4-14** e **16**

Flavonoide	Picos (<i>m/z</i>)
(1) 3,5,4'(OH) ₃ /7(OMe)	300 ([M] ⁺ , 100%), 167 (Ib , 6%), 121 (IIa , 26%)
(2) 5,4'(OH) ₂ /3,7(OMe) ₂	314 ([M] ⁺ , 100 %), 296 (M - H ₂ O, 15%), 167 (Ib 11%), 121 (IIa , 40%)
(4) 5,4'(OAc) ₂ /3,7(OMe) ₂	314 (M - CH ₂ =C=O - CH ₂ =C=O 100 %), 296 (M - H ₂ O, 15%), 167 (Ib , 11%), 121(IIa , após eliminação de CH ₂ =C=O e CH ₂ =O, 40%)
(5) 3,5,4'(OAc) ₃ /7(OMe)	426 ([M] ⁺ , 2%), 342 (M - CH ₂ =C=O - CH ₂ =C=O, 22%), 300 (M - CH ₂ =C=O - CH ₂ =C=O - CH ₂ =C=O, 100%), 121 (IIa , 10%)
(6) 3,5,3'(OH) ₃ /7,4'(OMe) ₂	330 ([M] ⁺ , 7%), 300 (M - H ₂ C=O, 100%), 167 (Ib , 6%), 121 (IIa , após eliminação de H ₂ C=O, 26%)
(7) 5,7,3',4'(OH) ₄ /3(OMe)	316 ([M] ⁺ , 100%), 301 (M - Me, 22%), 137 (IIb , 43%)
(8) 5(OH)/3,7,3',4'(OMe) ₄	358 ([M] ⁺ , 100%), 327 (M - H - H ₂ C=O, 12%), 343 (M - CH ₃ , 42%), 315 (M - CH ₃ - C=O, 38%), 167 (Ib , 5%), 165 (IIId , 18%), 135 (IIId - H ₂ C=O, 5%)
(9) 3,5,7,3',4'(OMe) ₅	372 ([M] ⁺ , 100%), 357 (M - CH ₃ , 70%), 341 (M - H - H ₂ C=O, 20%), 311 (M - CH ₂ =C=O - CH ₂ =C=O, 14%), 181 (Ic , 7%), 165 (IIId , 11%)
(10) 5(OAc)/3,7,3',4'-(OMe) ₄	358 (M - 42, 100 %), 343 (M - CH ₃ , 42%), 315 (M - CH ₃ - C=O, 38%), 167 (Ib , após eliminação de CH ₂ =C=O, 5%), 165 (IIId , 18%), 135 (IIId -H ₂ C=O, 5%)
(11) 5,3'(OH) ₂ /3,7,8,4'(OMe) ₄	374 ([M] ⁺ , 86%), 359 (M - Me, 100%), 151 (Ic , 10%)
(12) 5(OH)/3,7,8,3',4'(OMe) ₅	388 ([M] ⁺ , 7%), 345 (M - Me - C=O, 4%), 373 (M - Me, 100%), 165 (IIId , 9%)
(13) 5(OAc)/3,7,8,3',4'(OMe) ₅	388 (M - CH ₂ =C=O, 64%), 373 (M - Me, 100%), 345 (M - Me - C=O, 5%), 165 (IIId , 9%)
(14) 5,3'(OAc) ₂ /3,7,8,4'(OMe) ₄	416 (100%), 401 (M - Me, 98%), 359 (CH ₂ =C=O - Me, 95%) 151 (Ic , após eliminação de CH ₂ =C=O, 8%)
(16) 5,4'(OH) ₂ /3,7,8(OMe) ₃	344 ([M] ⁺ , 49%), 329 (M - Me, 100%), 314 (M - Me - Me, 19%) 121 (IIa , 23%)

Distinção entre flavonóis e flavonas com base nos sinais dos carbonos do anel C

A distinção entre flavonas (H-3) e flavonóis (RO-3) foi verificada pela ausência do sinal de carbono metínico em torno de δ_c 103 (CH-3 de flavonas) e a presença do sinal de C-3 em torno δ_c 136-140 (C-3, carbono não hidrogenado de flavonóis). O maior deslocamento químico do C-3 oxigenado justifica-se pelo efeito indutivo retirador de elétrons do átomo de oxigênio, que exerce efeito protetor por mesomeria sobre o átomo de carbono C-2.^{9,10} O sinal de carbono C-3 oxigenado desloca-se para região mais desblindada ($\Delta\delta_c = 10$ ppm) e o do C-2 para região mais blindada por cerca de $\Delta\delta_c = 17$ ppm quando comparados com os valores correspondentes de uma flavona. O deslocamento químico do sinal da carbonila é influenciado pela interação da ligação intramolecular com o hidrogênio do grupo HO-3 e HO-5. O primeiro causando uma blindagem de cerca de $\Delta\delta_c = 5$ ppm e o último uma desblindagem de magnitude similar. Assim, flavonas sem grupo hidroxila em C-3 e 5-hidroxi-flavonóis apresentam sinais praticamente com o mesmo deslocamento químico para a carbonila, já que os efeitos acima referidos para as hidroxilas se anulam. A metilação de HO-5 elimina o efeito da ligação de hidrogênio sobre o C-4 e, conseqüentemente, os flavonóis com H-5 ou MeO-5 apresentam aproximadamente o mesmo deslocamento químico para a carbonila C-4. A metilação do grupo HO-3 somente reduz parcialmente este efeito sobre C-4, como pode ser visto quando comparamos o flavonol **1**, δ_{c-4} 176,03

(HO-3) com o **2** δ_{c-4} 178,09 (MeO-3). Embora o sinal da carbonila possa fornecer informação quanto à substituição em C-5, a distinção entre flavonóis e seus 3-metoxi-derivados foi baseada nos deslocamentos químicos de C-2 e C-3. Comparando-se os dados de **1** com **2** foi possível deduzir claramente que a metilação do HO-3 provocou uma desblindagem de $\Delta\delta_c = 8,7$ e $1,9$ ppm nos sinais de C-2 e C-3, respectivamente. Um pequeno deslocamento nos sinais de C-10 (+1,1) e nos dois carbonos do anel C, C-1' ($\Delta\delta_c = -1,1$) e C-4' ($\Delta\delta_c = +0,96$) foi observado pela metilação de HO-3.¹¹ Do mesmo modo, através da comparação dos dados da flavona **15** e do flavonol **1** observou-se que a troca de H-3 por hidroxila causou modificação nos deslocamentos químicos de C-4 ($\Delta\delta_c = +5,9$ ppm), C-2 ($\Delta\delta_c = -16,8$ ppm) e C-4' ($\Delta\delta_c = -1,9$ ppm).

Caracterização do anel B

Anel B mono-oxigenado

Os sinais dos carbonos do anel B dos flavonóis **1 - 5**, **15** e **16** foram facilmente assinalados, usando-se a influência dos efeitos dos substituintes nos deslocamentos químicos e a simetria promovida pela presença de um único substituinte oxigenado no anel aromático. Dois sinais no espectro de RMN ¹³C representando dois pares de carbonos metínicos e os correspondentes deslocamentos químicos indicaram a presença de função oxigenada localizada em C-4'. O maior deslocamento químico dos sinais metínicos (em torno de δ_c

Tabela 3. Deslocamentos químicos dos átomos de carbono dos flavonoides naturais e derivados, em ppm (δ_c)^a

Flavonoide	OMe ou OAc ligado ao Carbono																						
	C-1'	C-2'	C-3'	C-4'	C-5'	C-6'	C-2	C-3	C-4	C-5	C-6	C-7	C-8	C-9	C-10	3	5	7	8	3'	4'		
(1) 3,5,4'(OH)/7(OMe) ^b	121,62	129,61	115,47	159,33	115,47	129,61	147,25	135,99	176,03	160,39	97,47	164,91	92,02	156,12	104,05	-	-	56,03	-	-	-	-	-
(2) 5,4'(OH)/3,7(OMe) ^b	120,52	130,24	115,68	160,29	115,68	130,24	155,95	137,86	178,09	160,96	97,77	165,13	92,37	156,33	105,21	59,72	-	56,10	-	-	-	-	-
(3) 3,5(OH)/7,4'(OMe) ^b	121,56	129,57	115,45	160,35	115,45	129,57	147,25	135,96	176,02	159,30	97,46	164,89	92,02	156,09	104,03	-	-	56,08	-	-	-	-	56,03
(4) 5,4'(OAc)/3,7(OMe) ^b	128,80	130,10	122,10	151,00	122,10	130,10	152,80	141,90	-	-	108,51	163,90	98,90	158,30	122,00	56,30	-	59,90	-	-	-	-	-
(5) 3,5,4'(OAc)/7(OMe) ^b	127,29	129,52	121,98	150,73	121,98	129,52	154,11	133,68	170,09	152,69	108,68	163,80	98,85	158,18	111,08	21,12	21,16	56,06	-	-	-	-	20,62
(6) 3,5,3'(OH)/7,4'(OMe) ^b	122,32	115,53	146,19	-	111,26	120,34	146,63	136,07	175,91	160,84	97,54	165,80	91,91	156,88	104,07	-	-	55,62	-	-	-	-	-
(7) ,5,7,3',4'(OH)/3(OMe) ^b	121,68	114,92	144,59	147,78	114,19	120,78	155,43	137,94	178,94	161,87	98,03	163,57	93,10	156,49	104,59	58,84	-	-	-	-	-	-	-
(8) 5(OH)/3,7,3',4'(OMe) ^b	123,34	111,68	149,18	151,79	111,26	122,59	156,25	139,40	179,16	162,45	98,24	165,86	92,63	157,14	106,45	60,61	-	56,41	-	-	-	56,23	56,47
(9) 3,5,7,3',4'(OMe) ^b	122,81	111,04	148,47	150,85	110,73	121,72	153,27	140,72	174,39	160,61	95,71	164,17	92,34	158,64	108,77	59,64	55,67	55,78	-	-	-	55,57	55,84
(10) 5(OAc)/3,7,3',4'(OMe) ^b	123,06	111,24	148,73	151,10	110,83	121,87	154,19	140,88	173,14	150,50	108,03	163,26	98,64	157,74	111,38	60,00	21,18	55,97	-	-	-	56,06	55,97
(11) 5,3'(OH)/3,7,8,4'(OMe) ^b	123,88	114,79	145,78	149,16	110,69	121,73	155,86	139,05	179,25	157,49	95,60	158,56	129,07	148,65	105,53	60,31	-	56,54	61,82	-	-	-	56,20
(12) 5(OH)/3,7,8,3',4'(OMe) ^b	123,53	111,56	149,22	151,88	111,41	122,73	156,02	139,18	179,42	157,79	95,83	158,80	129,20	148,86	105,75	60,56	-	56,79	61,96	56,33	-	-	56,42
(13) 5(OAc)/3,7,8,3',4'(OMe) ^b	123,38	111,19	148,95	151,37	111,19	122,26	154,19	142,30	173,60	145,73	104,49	156,01	134,94	150,28	112,41	60,16	21,34	56,69	61,64	56,09	-	-	56,15
(14) 5,3'(OAc)/3,7,8,4'(OMe) ^b	123,52	123,26	139,87	156,33	112,39	127,63	156,33	140,95	173,59	145,30	104,63	156,06	136,05	150,26	111,71	60,18	21,34	56,69	61,72	20,84	-	-	56,20
(15) 5,4'(OH)/7(OMe) ^a	121,09	128,57	115,99	161,22	115,99	128,57	164,07	130,03	181,95	161,30	97,96	156,13	92,67	157,24	104,68	-	-	56,03	-	-	-	-	-
(16) 5,4'(OH)/3,7,8(OMe) ^a	121,51	130,97	116,67	161,27	116,67	131,67	156,74	138,42	179,18	157,24	96,59	159,01	129,23	148,70	105,34	60,56	-	57,38	61,91	-	-	-	-

Os espectros foram obtidos em ²DMSO-d₆, ¹CDCl₃ e ³Acetona-d₆ tendo como referência interna o TMS. ^aO número de átomos de hidrogênio ligado a carbono foi deduzido com base na análise comparativa dos espectros de RMN ¹H e RMN ¹³C-DEPT. Espectros 2D ¹H-¹H-COSY, ¹H-¹H-NOESY, HMQC e HMBC foram também usados na atribuição dos deslocamentos químicos.

130) é aproximadamente o mesmo deslocamento químico encontrado para o benzeno, revelando que estes carbonos ocupam posição *meta* em relação à oxigenação,¹² sendo, portanto, atribuído aos CH-2' e CH-6'. O deslocamento químico do outro sinal (CH-3',CH-5') é típico de carbonos localizados em posição *orto* em relação a uma função oxigenada, cuja blindagem mesomérica desloca o sinal para região mais blindada (quando comparado ao benzeno) para cerca de δ_c 115 (flavonóides **1**, **2** e **15**).

As substâncias **1** e **2** após a acetilação da HO em C-4' forneceram os derivados **5** e **4**, respectivamente, que apresentaram mudanças nos deslocamentos químicos correspondentes aos carbonos *ipso* (blindagem $\Delta\delta_c = -9$ ppm), *orto* (desblindagem, $\Delta\delta_c = +6$ ppm) e *para* (desblindagem $\Delta\delta_c = +8$ ppm) como esperado.⁷ Nestes valores inclui-se o efeito de solvente, já que, segundo Pelter *et al.*,¹³ nos espectros dos flavonoides o valor do deslocamento químico dos carbonos individualmente aumenta por cerca de 0,5 ppm quando se troca o solvente o $CDCl_3$ por $DMSO-d_6$.

Caracterização de anel B 3',4'-dioxigenado

Os flavonóis desta categoria puderam ser apresentados em três grupos: um apresentando duas hidroxilas, **7** [δ_c : 114,92 (CH-2'), 114,19 (CH-5') e 120,78 (CH-6')]; dois representam uma hidroxila e uma metoxila, **6** [δ_c : 115,53 (CH-2'), 111,26 (CH-5') e 120,34 (CH-6')] e **11** [δ_c : 114,79 (CH-2'), 110,69 (CH-5') e 121,73 (CH-6')] e cinco flavonoides com duas metoxilas, **8-10** [δ_c : 111,04 – 111,68 (CH-2'), 110,73 – 11,26 (CH-5') e 121,72 – 122,59 (CH-6')], **12** [δ_c : 111,58 (CH-2'), 111,41 (CH-5') e 122,73 (CH-6')] e **13** [δ_c : 111,19 (CH-2'), 111,19 (CH-5') e 122,26 (CH-6')]. Os produtos de acetilação foram também considerados para confirmações estruturais. A comparação destes deslocamentos químicos permitiu também avaliar os efeitos da conversão de uma hidroxila em metoxila e em acetoxila. A localização das funções oxigenadas em carbonos adjacentes tornou-se relativamente facilitada pelos valores dos deslocamentos químicos em torno de δ_c 146 (C-3') e 151 (C-4', posição conjugada com o grupo carbonila e, conseqüentemente, maior deslocamento químico devido ao efeito mesomérico retirador de elétrons da carbonila) exibindo um efeito de blindagem de $\Delta\delta_c = 10$ ppm que cada oxigênio exerce no carbono *orto*. A posição certa da oxigenação dos flavonóis **6** e **7** foi determinada através da comparação com os modelos **I**, **II** e **III** (Figura 5).¹⁴ O flavonol **11** apresentou o anel B com o mesmo padrão de oxigenação de **6**, mas os espectros foram obtidos em $CDCl_3$ e acetona- d_6 (**6** e **7**) e, por isso, tornou-se necessário a utilização de comentários adicionais.

Na unidade parcial do modelo **III** (em relação a **I**, com anel B semelhante ao de **7**) e no flavonol **6** a troca da hidroxila em C-4' por uma metoxila produziu um deslocamento para região mais blindada (menor deslocamento químico) de aproximadamente $\Delta\delta_c = -4,0$ ppm no carbono 5' (pode ser atribuído a efeito γ do carbono metoxílico), localizado em posição *orto*. O C-1' localizado em posição *para* apresentou uma desblindagem de $\Delta\delta_c = +1,0$. Os carbonos C-2' e C-6' estão dispostos simetricamente em relação a um eixo imaginário contendo C-1' e C-4', sendo a diferença dos deslocamentos químicos dos seus sinais atribuída à presença do substituinte oxigenado em C-3'. Devido ao oxigênio proteger mais o carbono metínico em *orto* do que o localizado em posição *para*,¹⁰ o sinal com menor deslocamento químico (em região mais blindada) tornou-se facilmente atribuído ao C-2'. O problema para determinar com relativa segurança a posição ocupada pelo grupo metoxila pode ser resolvido levando-se em consideração o efeito produzido pela metilação nos dois carbonos que ocupam a posição *para* (C-1' e C-6') em relação à posição que passou pela modificação com a metilação. A comparação dos deslocamentos químicos dos carbonos dos anéis B de **7** e **6** mostrou que o CH-6' de **6** foi pouco afetado, enquanto no C-1' ocorre deslocamento para região




Figura 5. Valores dos deslocamentos químicos para o anel B dos flavonoides com oxigenação em 3' e 4'

mais desblindada de $\Delta\delta_c = 0,6$ indicando a mudança em C-4'.

Certamente, a acetilação da hidroxila presente no anel B de **11**, fornecendo o derivado **14**, foi importante para confirmar inequivocamente os deslocamentos químicos dos carbonos e definir o padrão de substituição da substância **11**.⁸

O efeito de metilação da hidroxila do C-3' de **11**, observado nas substâncias **8**, **9**, **10**, **12** e **13**, foi refletido no carbono em posição *para*, CH-6', que apresentou um deslocamento de $\Delta\delta_c = 1,0$ ppm, e *orto*, CH-2', blindagem de $\Delta\delta_c = 3,3$ ppm.

Caracterização do anel A

A atribuição dos deslocamentos químicos dos átomos de carbono do anel A apresentou algumas dificuldades quando comparada com a referente ao anel B, em decorrência principalmente da assimetria introduzida pelos dois pontos de ligação do anel A com o anel heterocíclico C.

O sinal de C-10 (não oxigenado) pode ser mais facilmente identificado pela comparação dos espectros de RMN ^{13}C -HBBDD e RMN ^{13}C -DEPT (ou APT), permitindo a distinção entre os sinais de carbonos metínicos e quaternários, e pelo seu deslocamento químico comparado com os dos sinais dos carbonos quaternários restantes oxigenados. O assinalamento dos sinais dos carbonos metínicos CH-6 e CH-8 do anel A de flavonóides do tipo floroglucinol é relativamente mais difícil, mas foi monitorado pelo modelo quercetina depois de considerações cuidadosas das correlações em espectro com interação de acoplamento a uma e três ligações C-H¹⁵. Os resultados mostraram que o deslocamento químico do CH-8 aparece com cerca de $\Delta\delta_c = 5,0$ ppm menor do que o do CH-6. Baseado no efeito que a metilação de HO-3' exerce sobre o carbono vizinho (CH-2'), revelando a diminuição no deslocamento de $\Delta\delta_c = 3,3$ ppm, tornou-se possível o comportamento análogo também para o carbono CH-8 adjacente ao carbono eterificado C-9, revelando-se deslocado para região mais desblindada que o CH-6 adjacente ao carbono C-5 hidroxilado. Sendo assim, a ausência do valor mais baixo (≈ 93 ppm) significa a presença de um substituinte nesta posição, ocorrendo também a correspondente blindagem dos carbonos 7 e 9 por efeito mesomérico.

Anel A 5,7-dioxigenados

Os valores dos deslocamentos químicos dos carbonos metínicos CH-6 ($\delta_c \sim 98$) e CH-8 ($\delta_c \sim 93$) revelam modificação dependente dos grupos substituintes presentes em C-5 e C-7 (Tabela 3).

Os espectros de RMN¹H das substâncias naturais **1-3**, **6-9** e **15** revelaram sinal correspondente à hidroxila em ligação de hidrogênio (HO-5) com o C-4 e permitiram reconhecer a presença de função oxigenada adicional no carbono C-7. Os demais flavonoides com o mesmo padrão de oxigenação (5,7-dioxigenados) são os derivados acetilados **4** e **5** e **10** e o metilado **9**.

A troca da hidroxila em C-7 do flavonol **7** por uma metoxila, **1-3**, **6**, **8** e **15** não gerou modificação significativa nos deslocamentos químicos nos carbonos *ipso* e *orto*, resultado que pode ser justificado pela variação no uso de solventes na obtenção dos espectros de RMN¹³C. O efeito de solvente revelado pela comparação de espectros obtidos em acetona e DMSO permitiu observar desblindagem no carbono da hidroxila fenólica de $\Delta\delta_c = 0,6$ ppm (carbono *ipso*) e blindagem de 0,5 no carbono *orto*, 0,3 no *meta* e 0,7 *para*.¹⁰ Os espectros de RMN¹³C dos derivados acetilados **4**, **5** e **10** revelaram blindagem C-*ipso* e desblindagem nos carbonos *orto* e *para*, como esperado (Tabela 3).

Anel A 5,7,8-trioxigenado

Foram isolados três flavonóis com anel A 5,7,8-trioxigenado, todos com grupo hidroxila em C-5 (**11**, **12** e **16**), e dois foram usados para a preparação dos derivados acetilados **13** e **14**, obtendo-se assim produtos com grupo acetoxila em C-5. As outras duas funções oxigenadas poderiam ocupar as posições C-6 e C-7, C-7 e C-8 ou C-6 e C-8 deste anel. A última alternativa foi descartada através de argumentação biogenética e pelo deslocamento químico apresentado pelo C-10, que é praticamente o mesmo dos flavonóis com anel A dioxigenado com oxigenação em C-7, que protege C-10 por efeito mesomérico. A caracterização do anel A dos flavonóis com padrão de oxigenação 5,7,8-trioxigenados ou 5,6,7-trioxigenados não pode ser definida com a necessária garantia pelo valor de deslocamento químico do carbono metínico, já que foi encontrado um valor médio (δ_c 95) para os deslocamentos químicos de CH-6 e CH-8, observando-se uma diferença de aproximadamente $\Delta\delta_c = 3$ ppm que pode ser tanto para o carbono CH-6 como para o CH-8 (como modelo pode-se citar a substância **8**). Entretanto, os espectros de RMN¹³C dos derivados acetilados **13** e **14**, obtidos através de reação de acetilação dos flavonóis **11** e **12** (conversão da hidroxila em C-5 em acetoxila) revelaram, como esperado, os sinais dos carbonos em posição *orto* (CH-6 e C-10) e *para* (C-8) com maiores valores de deslocamento químico (δ_{CH-6} 104,00; δ_{CH-10} 111,70), que demonstram, claramente, a menor densidade eletrônica nestes carbonos (atenuação do efeito mesomérico doador de elétrons do átomo de oxigênio ligado ao C-5). Com base nestes valores de deslocamentos químicos foi possível assegurar inequivocamente o carbono metínico como sendo CH-6 e o quaternário C-10. Os carbonos localizados em posição *para* (C-8) também foram afetados, revelando uma diferença de deslocamento para região mais desblindada de $\Delta\delta_c = 6,0$ ppm.

Aplicação de técnicas 1D (NOEDIFF e DEPT) e experiências bidimensionais (2D)

A atribuição inequívoca dos δ_H e δ_C das substâncias naturais **1**, **2**, **6-8**, **11**, **12**, **15** e **16** apoiou-se também nas técnicas de 2D de RMN e nas modificações observadas nos dados espectrais dos derivados **3-5**, **9-10**, **13-14**. Estes derivados também forneceram informações adicionais importantes para elucidção estrutural.

Os espectros de RMN¹³C-DEPT 135° das substâncias naturais **1** e **2**, apresentaram 5 (**1**) e 6 (**2**) sinais de carbonos hidrogenados, sendo quatro atribuídos a carbonos metínicos (**1** e **2**), uma metoxila (**1**) e duas

metoxilas (**2**). Os espectros de HMQC permitiram estabelecer as correlações diretas (¹J_{CH}): CH-6 [δ_H/δ_C 6,35/97,77 (**2**) e 6,32/97,47(**1**)], CH-8 [δ_H/δ_C 6,74/92,37 (**2**) e 6,71/92,02(**1**)]; 2CH-3',5 [δ_H/δ_C 6,92/115,68 (**2**) e 6,32/115,47(**1**)]; 2CH-2',6' [δ_H/δ_C 7,96/130,24 (**2**) e 8,06/129,61(**1**)]. As posições das metoxilas foram estabelecidas pelos espectros HMBC: MeO-7/C-7, ³J_{CH} [δ_H/δ_C 3,84/164,91 (**1**) e 3,84/165,13 (**2**)]; H-6/C-7, ²J_{CH} [δ_H/δ_C 6,32/164,91 (**1**) e 6,35/165,13 (**2**)] e H-8/C-7, ²J_{CH} [δ_H/δ_C 6,71/164,91 (**1**) e 6,74/165,13 (**2**)] e MeO-3/C-3, ³J_{CH} [3,78/137,86 (**2**)]. A acetilação deste flavonol (**1**) forneceu o derivado **5**, que foi usado também para obtenção do espectro de NOESY e observar mais uma vez a localização da metoxila em C-7 pelas interações espaciais com os hidrogênios H-6 (δ_H 6,65) e H-8 (δ_H 6,84).

A interpretação dos resultados obtidos pelas experiências 2D de RMN dos derivados seguiu o mesmo procedimento e forneceu informações adicionais úteis.

Os espectros de RMN¹H (1D e 2D ¹H-¹H-COSY) dos flavonóis **6**, **7** e **8** revelaram sinais de átomos de hidrogênio atribuídos aos sistemas AB do anel A e ABC do anel B. Estes sistemas foram confirmados pelo espectro 2D ¹H-¹H-COSY de **7** através de picos transversais correspondentes às interações spin-spin do H-6 (δ_H 6,25) com H-8 (δ_H 6,48) e do H-6' (δ_H 7,57) com H-2' e H-5'. Os espectros de RMN¹H e RMN¹³C (¹H) e DEPT) indicaram a presença de uma MeO em **7**, quatro em **8** e **10** e cinco em **9**. Os espectros HMQC de **7** e **8** foram usados para estabelecer as correlações dos carbonos metínicos e metoxilicos (uma em **7** e quatro em **8**). O valor do deslocamento químico do carbono metoxílico (δ_c 58,84) e o espectro HMBC através da correlação do MeO-3 (δ_c 3,86) com C-3 (δ_c 137,94, ³J_{CH}) indicaram indubitavelmente a presença da metoxila em C-3 do flavonoide **7**. O espectro de RMN¹H do flavonoide **8** mostrou, além dos sinais das metoxilas (com integração para 4 MeO) e dos sistemas AB e ABC, sinal de HO-5 (hidroxila em ligação de hidrogênio com a carbonila no C-4), permitindo a localização das 4 metoxilas nos carbonos C-3, C-7, C-3' e C-4', mesmo sem conhecer até este ponto os valores dos deslocamentos químicos dos átomos de hidrogênio de cada uma. Os picos transversais correspondentes às interações heteronucleares (³J_{CH}) de C-3 (δ_c 139,40) com MeO-3 (δ_c 3,87), C-7 (δ_c 165,86) com MeO-7 (δ_c 3,89), C-3' (δ_c 149,18) com MeO-3' (δ_c 3,97) e C-4' (δ_c 151,79) com MeO-4' (δ_c 3,98) observados no espectro HMBC permitiram definir o valor do deslocamento químico para cada metoxila e de cada carbono não hidrogenado. O espectro de NOESY mostrou interações espaciais das metoxilas MeO-7 (δ_H 3,89) com H-6 (δ_H 6,37) e H-8 (δ_H 6,46), MeO-3' (δ_H 3,87) com H-2' (δ_H 7,70) e MeO-4' (δ_H 3,98) com H-5' (δ_H 7,00), confirmando, portanto, as atribuições dos δ_H dos grupos metoxílicos.

Os espectros de RMN¹H do flavonol **6** revelaram sinais para os sistemas AB e ABC e para duas metoxilas em δ_H 3,92 e 3,93. As interações dipolares de MeO-4' (δ_H 3,93) com H-5' (δ_H 7,11) e MeO-7 (δ_H 3,92) com H-6 (δ_H 6,31) e H-8 (δ_H 6,68) foram observadas no espectro 2D NOESY, confirmando a caracterização estrutural de **6** como 3,3',5-triidroxi-4',7-dimetoxiflavona.

O flavonol permetilado **9** mostrou sinais de interação espacial no espectro de NOESY das metoxilas MeO-7 (δ_H 3,93) com H-8 (δ_H 6,57), MeO-5 (δ_H 3,96) com H-6 (δ_H 6,39), MeO-3' (δ_H 3,98) com H-2' (δ_H 7,74) e MeO-4' (δ_H) com H-5' (δ_H 7,02).

A principal diferença observada na comparação dos espectros de RMN¹H dos flavonóis **11** e **12** foi atribuída à presença de uma metoxila adicional em **12**. Os anéis A de **11** e **12** contêm somente um átomo de hidrogênio isolado. Os sinais simples correspondentes a estes átomos de hidrogênio aparecem em δ_H 6,41 (**11**) e δ_H 6,43 (**12**) nos espectros de RMN¹H e apresentaram correlações com os carbonos metínicos em δ_c 95,83 e 95,60, respectivamente, nos espectros de HMQC. O espectro HMBC de **11** mostrou correlação do H-6 (δ_H 6,41) através de duas ligações (²J_{CH}) com os carbonos

C-5 (δ_C 157,49) e C-7 (δ_C 158,56) e de três ligações ($^3J_{CH}$) com C-8 (δ_C 129,07) e C-10 (δ_C 105,53). Estes dados permitiram assegurar a localização da metoxila adicional do anel A no carbono C-8.

O NOE (8%) observado no sinal de H-5' (δ_H 7,10) do derivado acetilado **14**, revelado pela irradiação na frequência de absorção dos hidrogênios metoxílicos representados pelo simpleto em δ_H 3,96 (MeO-4') no espectro de RMN 1H , serviu para confirmar a presença da metoxila em C-4'. Irradiação nas frequências de absorção dos átomos de hidrogênio das duas metoxilas em δ_H 3,87 (MeO-3) e 3,94 (MeO-7) mostraram NOE de 1 e 2% nos sinais do H-2' (δ_H 7,78) e H-6' (δ_H 7,76) e de 5% em H-6 (δ_H 6,41), respectivamente.

O espectro de NOESY do flavonol **12** mostrou interação das metoxilas em MeO-7 (δ_H 3,96, MeO-3' (δ_H 3,98) e MeO-4' (δ_H 3,99) com os átomos de hidrogênio H-6 (δ_H 6,43), H-2' (δ_H 7,82) e H-5' (δ_H 7,03), respectivamente. Estas informações serviram mais uma vez para confirmação das posições destas metoxilas.

Todos os flavonóis naturais isolados de *Solanum paludosum* e *S. jabrense* encontram-se descritos na literatura, porém poucos ou nenhum dados espectroscópicos existiam para as substâncias. Os dados de RMN 1H ou ^{13}C para os flavonoides **1**,^{9,16} **2**,¹⁷ **6**,⁹ **7**,⁹ **8**,¹⁸ **12**,¹⁹ **15**,¹⁰ e **16**²⁰ foram comparados com os da literatura. Os flavonoides **1**, **6**, **11**, **12**, **15** e **16** foram registrados pela primeira vez no gênero *Solanum*.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq, CAPES e FAPERJ pelas bolsas e auxílios financeiros concedidos, ao Setor de Química de Produtos Naturais (SQPN), Laboratório de Ciências Químicas (LCQUI), Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) – Campus Leonel Brizola/Campos dos Goytacazes - RJ e ao Centro Nordestino de Aplicação e Uso de Ressonância Magnética Nuclear (CENAUREMN)-Programa de Pós-graduação em Química Orgânica (PPGQO), Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza – CE, pelos espectros 1D e 2D de Ressonância Magnética Nuclear (RMN 1H e RMN ^{13}C).

REFERÊNCIAS

- Silva, T. M. S.; Braz-Filho, R.; Carvalho, M. G.; Agra, M. F.; *Biochem. Syst. Ecol.* **2002**, *30*, 479.
- Silva, T. M. S.; Nascimento, R. J. B.; Camara, C. A.; Agra, M. F.; Braz-Filho, R.; Carvalho, M. G.; *Biochem. Syst. Ecol.* **2004**, *32*, 513.
- Silva, T. M. S.; *Tese de Doutorado*, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil, 2002.
- Camara, C. A.; Pinto, A. C.; Vargas, M. D.; *Tetrahedron* **2002**, *58*, 6135.
- Mabry, T. J.; Markam, K. R.; Thomas, M. B.; *The systematic identification of flavonoids*, Springer: New York, 1970.
- Fossen, T.; Andersen O. M. Em *Flavonoids Chemistry, Biochemistry and Applications: Spectroscopic Techniques Applied to Flavonoids*; Anderson, O. M.; Markham, K. R., eds.; Taylor & Francis: New York, 2006, p. 37-142.
- Goudard, M.; Favre-Bonvin, J.; Lebreton, P.; Chopin, J.; *Phytochemistry* **1979**, *18*, 186.
- Markham, K. R. Em *Methods in plant biochemistry: Flavones, flavonols and their glycosides*; Harborne, J. B.; Mabry, T. J., eds.; Academic Press: New York, 1989, p. 197-235.
- Agrawal, P. K. E.; *Carbon-13 NMR of Flavonoids, Studies in Organic Chemistry-39: Methods in Signal Assignment*, Elsevier: Amsterdam, 1989.
- Markham, K. R.; Chari, M.; Mabry, T. J. Em *The Flavonoids: Advances in Research: Carbon-13 NMR Spectroscopy of Flavonoids*; Harborne, J. B.; Mabry, T. J., eds.; Chapman & Hall: London, 1982, p. 19-134.
- Mabry, T. J.; Markham, K. R. Em *The Flavonoids*; Harborne, J. B.; Mabry, T. J., eds.; Academic Press: New York, 1975.
- Kingsbury, C. A.; Looker, J. H.; *J. Org. Chem.* **1975**, *40*, 1120.
- Pelter, A.; Ward, R. S.; Gray, T. I.; *J. Chem. Soc., Perkin Trans.* **1976**, *1*, 2475.
- Bohm, B. A.; *Introduction to Flavonoids*, Harwood Reading: Amsterdam, 1999, p. 212.
- Lallemant, J. Y.; Duteil, M.; *Org. Magn. Reson.* **1977**, *9*, 179.
- Barberá, O.; Sanz, J. F.; Sánchez-Parareda, J.; Marco, J. A.; *Phytochemistry* **1986**, *25*, 2361.
- Parsons, I. C.; Gray, A. I.; Waterman, P. G.; Hartley, T. G.; *J. Nat. Prod.* **1993**, *56*, 46.
- Li, S.; Lo, C.-Y.; Ho, C.-T.; *J. Agric. Food Chem.* **2006**, *54*, 4176.
- Ferracin, R. J.; Silva, M. F. G. F.; Fernandes, J. B.; Vieira, P. C.; *Phytochemistry* **1998**, *47*, 393.
- Horie, T.; Ohtsuru, Y.; Shibata, K.; Yamashita, K.; Tsukayama, M.; Kawamura, Y.; *Phytochemistry* **1998**, *47*, 865.