

ADIÇÃO DE ANILINAS À NAFTOQUINONA EM ÁGUA E EM FASE SÓLIDA

Sabrina T. Martinez\*, Bárbara V. Silva e Angelo C. Pinto

Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, CT, Bl. A, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 21941-909 Rio de Janeiro – RJ, Brasil

Vitor F. Ferreira e Fernando de Carvalho da Silva

Instituto de Química, Universidade Federal Fluminense, Outeiro de S. João Batista, s/n, 24210-150 Niterói – RJ, Brasil




Figura 1S. Espectro de RMN <sup>1</sup>H da 2-anilino-1,4-naftoquinona




Figura 2S. Espectro de RMN <sup>13</sup>C da 2-anilino-1,4-naftoquinona

\*e-mail: sabrinatmartinez@yahoo.com.br




Figura 3S. Espectro de RMN  $^{13}\text{C}$  (DEPT 135) da 2-anilino-1,4-naftoquinona




Figura 4S. Espectro de RMN  $^1\text{H}$  da 2-p-toluidil-1,4-naftoquinona




Figura 5S. Espectro de RMN  $^{13}\text{C}$  da 2-p-toluidil-1,4-naftoquinona




Figura 6S. Espectro de RMN  $^{13}\text{C}$  (DEPT 135) da 2-p-toluidil-1,4-naftoquinona




Figura 7S. Espectro de RMN <sup>1</sup>H da 2-p-anisidil-1,4-naftoquinona




Figura 8S. Espectro de RMN <sup>13</sup>C da 2-p-anisidil-1,4-naftoquinona




Figura 9S. Espectro de RMN  $^{13}\text{C}$  (DEPT 135) da 2-*p*-anisidil-1,4-naftoquinona




Figura 10S. Espectro de massas da 2-anilino-1,4-naftoquinona




Figura 11S. Espectro de massas 2-p-toluidil-1,4-naftoquinona




Figura 12S. Espectro de massas da 2-p-anisidil-1,4-naftoquinona




Figura 13S. Espectro de UV-Visível da 2-anilino-1,4-naftoquinona




Figura 14S. Espectro de UV-Visível da 2-*p*-toluidil-1,4-naftoquinona




Figura 15S. Espectro de UV-Visível da 2-*p*-anisidil-1,4-naftoquinona




Figura 16S. CCD dos produtos comparados com o material de partida 1,4-naftoquinona. O eluente utilizado foi hexano/acetato de etila 30%. \*Este produto não teve a sua estrutura confirmada, no entanto, provavelmente é o resultado do ataque do nitrogênio da *p*-anisidina à carbonila da 1,4-naftoquinona (Ver item Resultados e Discussão)